

---

## SITUATION REGION DE SIKASSO EN AOUT 2007

La situation alimentaire est bonne dans la région.

Les hauteurs de pluies enregistrées au cours du mois sont excédentaires et supérieures à celles de l'année dernière à la même période au niveau de toutes les stations des chefs lieux de cercle. Le cumul pluviométrique du 1<sup>er</sup> mai au 31 août 2007 est excédentaire et partout supérieur à celui de 2006 à la même période excepté Koutiala où il est inférieur.

La crue se poursuit sur les principaux fleuves de la région. Les hauteurs d'eau sont supérieures à celles de 2006 à la même période.

La situation phytosanitaire est marquée par la manifestation des foreuses de tiges et des chenilles défoliatrices sur 62 ha dans le cercle de Koutiala. Des traitements sont en cours. Les dégâts sont légers. Dans les cercles de Sikasso et Kadiolo, des larves de coléoptères ont été signalées sur 163 ha de coton. Les dégâts sont jugés légers et les traitements en cours.

L'évolution de la campagne agricole est bonne dans la région. Les superficies réalisées sont supérieures à celles de l'année 2006 pour les cultures de maïs, de mil, de sorgho, de riz et de fonio. Les dépassements des superficies de céréales sèches sont dus à la baisse des superficies du coton. Les stades dominants sont la montaison- épiaison pour le maïs, le tallage montaison pour le mil/sorgho et la ramification épiaison pour le fonio.

L'accès difficile aux herbicides a favorisé l'enherbement dans plusieurs localités. Par ailleurs, l'excès des pluies provoque le jaunissement du maïs.

Les superficies réalisées en coton sont nettement inférieures à celles de l'an passé dans les cercles de Koutiala, Yorosso et Sikasso. Le cotonnier est à la floraison et formation des capsules.

Le riz de maîtrise dans la zone ODRS est à l'entretien des pépinières et au repiquage. Superficies repiquées inférieures à celles de 2006. Retard dû à l'abondance et la fréquence élevée des pluies qui limitent les opérations de repiquage.

Les conditions générales d'élevage sont bonnes dans la région. L'état d'embonpoint des animaux est satisfaisant. La campagne de vaccination contre la péripneumonie contagieuse bovine a démarré dans les cercles de Kadiolo et Kolondiéba situés à la frontière entre le Mali et de la Côte d'Ivoire où les mouvements des troupeaux transhumants débutent tôt. La situation épizootique est marquée par des cas de pasteurellose bovine et ovine dans le cercle de Yorosso. On note 18 contaminés dont 6 bovins et 12 ovins, 7 malades dont 3 bovins et 4 ovins ; 4 morts.

La quantité de poissons (frais, fumés, séchés) contrôlée sur les marchés est supérieure à celle du mois précédent.

Les marchés sont suffisamment approvisionnés en céréales locales ou importées. La tendance générale des prix est la hausse à Sikasso, Koutiala, Yorosso et la stabilité ailleurs.

Les effectifs d'animaux présentés à la vente sont en augmentation sur la plupart des marchés, excepté ceux de Kadiolo, Koutiala et Yorosso où ils sont en diminution. Le prix moyen des animaux en hausse par rapport au mois passé.

Les réserves familiales sont satisfaisantes pour la période. Des stocks communautaires existent dans la plupart des communes à travers la région.

Le stock dans les banques de céréales est de 1943T514 de mil, sorgho et maïs contre 2606T716 le mois passé.

La situation épidémiologique est relativement calme. Elle est caractérisée par 1 cas de méningite dont 0 décès dans le cercle de Kolondiéba.

La distribution de farine enrichie et d'huile dans le cadre de l'amélioration de l'état nutritionnel des groupes vulnérables (enfants de 6 à 59 mois, femmes enceintes et allaitantes, les personnes vivant avec le VIH SIDA et les tuberculeux) est en cours dans le cercle de Kolondiéba.

Les sites d'orpaillage traditionnels de Dadja Finkolo, Halhamidoulaye (commune de Fourou) de Massiogo (commune de Misseni) et le site minier de Siana enregistrent des arrivées inhabituelles de ménages et de bras valides.