

SYNTHESE DE LA SITUATION MOIS D'AOÛT 2008

Points Saillants

- Bonne évolution de la campagne agricole 2008-2009 malgré de légers retards observés par endroits.
- Prolifération des sautériaux et oiseaux granivores dans les zones habituelles d'infestation nécessitant des dispositions urgentes.

Situation alimentaire

La situation alimentaire est caractérisée par :

- des disponibilités céréalières suffisantes pour la demande et en légère augmentation à la faveur d'un début de déstockage des réserves familiales dans certaines grandes zones de production au vu de la bonne physionomie de la campagne agricole 2008-2009, de la mise en vente des stocks des banques de céréales et aux autres mesures d'atténuation de la cherté de la vie de l'Etat et de ses Partenaires,
- une stabilité voire une baisse des prix des céréales sèches par rapport au mois dernier. Cependant, le niveau des prix des mil/sorgho reste élevé par rapport à la moyenne des 5 dernières sans atteindre le niveau record de 2005. Celui des autres denrées (lait, huile..) reste également élevé.
- et une disponibilité laitière en nette amélioration pour l'alimentation humaine dans les zones pastorales suite à la régénération des pâturages.

Pluviométrie et Crue/Décrue des fleuves

La hauteur mensuelle de pluies recueillies est de normale à largement excédentaire dans toutes les stations des chefs lieux excepté celles de Koulikoro, Kangaba, Koutiala, San, Ansongo, Kidal et Tessalit où elle est déficitaire à très déficitaire. Elle est dans l'ensemble inférieure à celle de la campagne dernière. La répartition des pluies dans le temps et dans l'espace est globalement satisfaisante mais la 1^{ère} décennie d'août a été pratiquement sèche dans le nord du pays tandis que des excès d'eau sont constatés dans le sud de la région de Mopti.

Le cumul des pluies du 1^{er} mai au 31 août 2008 est de normal à largement excédentaire sauf dans les stations de Koulikoro, Koutiala, Barouéli, San, Niafunké où il est déficitaire et très déficitaire à Ansongo. Ce cumul saisonnier demeure dans l'ensemble inférieur à celui de la campagne précédente excepté dans les

régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso et Kidal où il est globalement supérieur.

La crue se poursuit sur les différents cours d'eau avec un rythme jugé élevé sur le Niger tandis que celui du Bani s'est affaibli à Djenné (Mopti). Les côtes relevées au 31 août restent supérieures à celles de 2007 à la même date sauf sur le Bakoye à Bafoulabé où elles sont inférieures.

Déprédateurs

La situation phytosanitaire est caractérisée par :

- des dégâts légers de sautériaux, de chenilles, de pucerons et de termites sur les cultures dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti. Des traitements chimiques et des battues physiques sont en cours par les brigades villageoises avec l'appui des services techniques et des ONG comme World vision dans la région de Mopti ;
- des apparitions de cantharides sans dégât pour le moment dans la région de Kayes,
- une forte pullulation d'oiseaux granivores dans les régions de Mopti, Tombouctou, Gao, Ségou (zone O.N), Koulikoro et Kayes. Des dégâts légers sont enregistrés par endroits sur le riz de contre saison en maturation et la menace se fait sentir dans certaines zones rizicoles notamment à l'ON. Des préparatifs sont en cours pour des traitements aériens.
- et une situation calme pour le criquet pèlerin.

Campagne agricole.

Les semis sont terminés pour les cultures sèches (mil, sorgho, riz de bas fonds..) sauf pour la variété de Sorgho « gadiaba » cultivé dans le sahel occidental. Les superficies en végétation sont globalement supérieures à celles de l'année dernière. Les stades végétatifs dominants des cultures sont la montaison-début épiaison pour le mil, le sorgho et le fonio, l'épiaison-début maturation pour le maïs et la ramification-floraison pour les légumineuses. Cependant, on note des poches de légers retards dans le Nord de Mopti, au sud de Tombouctou et dans le cercle de Gao. L'aspect végétatif des cultures est globalement bon. Toutefois, l'enherbement et l'insuffisance d'urée se ressentent sur l'état des cultures dans la région de Sikasso, en zone O.H.V.N à Koulikoro et cela va engendrer une baisse de rendement notamment au niveau du maïs, plus exigeant en engrais.

En riziculture, la campagne de saison évolue normalement. La mise en place des cultures de riz irrigué tire à sa fin en zone ON et se poursuit dans les zones à riz submersion et au niveau des PIV. Les superficies réalisées sont à présent supérieures à celles de l'année dernière. Les plants sont au stade de tallage-montaison et présentent un bon aspect végétatif. Le déroulement des activités est jugé bon surtout avec la bonne accessibilité à l'engrais (Initiative Riz). Cependant avec la forte allure de la crue, des cas de noyades sont observés dans les plaines rizicoles.

S'agissant du coton, les superficies emblavées sont nettement inférieures aux objectifs (46%). Le cotonnier est au stade de floraison-formation de capsules pour les premiers semis et ramification-apparition de boutons floraux pour les autres. L'aspect végétatif des cultures est bon et les travaux d'entretien des parcelles se poursuivent normalement.

Les cultures de décrue évoluent normalement dans les régions de Mopti et Tombouctou avec des réalisations supérieures à celles de 2007. Le stade dominant des cultures est la montaison-épiaison pour le mil/sorgho de décrue et la récolte pour les légumineuses.

Elevage et Pêche

L'état des pâturages est bon dans le sud du pays. Au nord, il s'est beaucoup amélioré à la faveur des bonnes pluies enregistrées ce mois-ci mais leur état demeure encore en dessous de la normale dans l'ensemble. Partout, les conditions d'abreuvement sont bonnes à la faveur des pluies tombées. Les troupeaux transhumants sont en séjour dans les pâturages de saison de pluies tandis que les sédentaires sont sous gardiennage dans les campements d'hivernage. L'état d'embonpoint des animaux est bon dans le sud et moyen à bon au nord. La situation zoo sanitaire est marquée par des cas de suspicion de fièvre aphteuse dans les cercles de Kadiolo, Yorosso et Kolondiéba, de peste de petits ruminants à Bougouni, Kolondiéba et de pasteurellose à Kadiolo. Des mesures de police sanitaire ont été prises.

La campagne de vaccination contre la pasteurellose bovine, ovine, caprine et le charbon symptomatique se poursuit à travers le pays.

Dans le domaine de la pêche, c'est la phase « morte » suite à la montée des eaux et les

captures sont en diminution par rapport au mois précédent.

Migrations

Des arrivées inhabituelles et des mouvements internes de bras et de ménages sont signalés dans les cercles de Kadiolo et Kolondiéba en direction des sites d'orpillage au détriment des travaux agricoles. Par ailleurs, les départs habituels des bras valides vers les centres urbains sont amorcés dans la région de Mopti.

Marchés

Sur les marchés, l'offre en céréales est stable ou en légère augmentation par rapport au mois dernier excepté dans les régions de Ségou, Mopti et Gao où elle est plutôt en légère diminution. Les ventes de céréales au niveau des banques communautaires, l'Offre Publique de Vente de l'OPAM et la reprise de la navigation fluviale contribuent entre autres à améliorer l'état d'approvisionnement des populations. Les disponibilités physiques en céréales restent de moyennes à faibles mais partout suffisantes pour la demande. Le prix des mil/sorgho est en stabilité ou en légère baisse par rapport au mois précédent sur la quasi-totalité des marchés de chefs-lieux de cercle. Le niveau de prix du mil-sorgho est supérieur à celui d'août 2007 et à la moyenne des cinq dernières années sur les marchés des chefs-lieux des cercles.

Les effectifs d'animaux présentés à la vente sont en globalement en baisse par rapport au mois précédent. La raison en est la diminution des besoins pécuniaires pour l'approvisionnement en intrants en zones agricoles et l'éloignement des troupeaux transhumants des marchés. Le prix moyen de la chèvre est en fluctuation avec une prédominance de la hausse par rapport au mois dernier et partout supérieur à la moyenne des 5 dernières années.

Les termes de l'échange chèvre- mil sont également en fluctuation avec cependant une détérioration sur les marchés des chefs-lieux des cercles de la région de Kayes. Comparés à la moyenne des cinq dernières années, ils sont stables ou en amélioration dans les régions de Tombouctou, Gao, Kidal et en détérioration ailleurs.

Habitudes alimentaires

Les habitudes alimentaires sont normales.

Réserves Alimentaires

Le niveau des réserves alimentaires familiales est apprécié moyen à faible suivant les communes dans les régions de Sikasso, Ségou, Mopti et jugé faible ailleurs.

Au niveau des stocks communautaires, les ventes de céréales sont en cours dans l'ensemble des régions. Les quantités déclarées en banques sont de 391,756 T pour la région de Ségou, 46,35 T de mil/sorgho et 34,6 T de paddy à Mopti, 129,100 T de mil/sorgho et 3,900 T de riz à Tombouctou, 108,630 T de céréales à Gao.

Le PAM a livré au cours du mois 236,779 T de vivres composés de farine de maïs, de farine enrichie, , d'huile, de petit pois et de sucre en appui à la santé-nutrition dans les cercles de Kayes, Diéma, Bafoulabé, Kéniéba, Kita et Nioro (Kayes).

La Croix Rouge Malienne a fait un don de 74 T de semoule, 41 T de riz, 17,900 T d'huile, 6,600 T de sucre 420 kg de sel à des familles déplacées ou démunies des cercles de Kidal, Tessalit et Tin-Essako (Kidal). Des bâches et nattes ont été également données.

Santé/ Nutrition

La situation épidémiologique est marquée par :

- 6 cas de méningite dont 0 décès dans les régions de Kayes et Koulikoro,
- 2 cas de rougeole dont 0 décès dans les régions de Kayes et Kidal,.
- 2 cas de paralysie flasque aigue dont 0 décès dans la région de Kayes.
- 1 cas de fièvre jaune dont 0 décès dans la région de Koulikoro,
- et 75 cas de dracunculose dont 0 décès dans la région de Kidal.

De nombreux cas de paludisme dont 0 décès sont signalés dans la région de Kidal.

Sur le plan nutritionnel, 3 cas d'enfants malnutris aigus dont 0 décès sont enregistrés dans la région de Sikasso et 358 cas dont 7 sévères à Kayes.

Faits Exceptionnels

Des pluies diluviennes ont causé d'importants dégâts matériels dans les cercles de Diéma, Kita (Kayes), Banamba (Koulikoro), Bla et Macina, (Ségou). On déplore des pertes en vie humaine à Diéma.