

SITUATION REGION DE MOPTI EN AVRIL 2008

La situation alimentaire est normale dans la région.

Quelques hauteurs de pluies ont été enregistrées en troisième décennie du mois dans la région.

La décrue se poursuit sur les cours d'eau. Toutefois, au cours du mois, on a assisté à une montée du niveau des eaux suite aux lâchées d'eau au niveau du barrage de Sélingué et du seuil de Talo. Les côtes enregistrées sur le Niger et le Bani à Mopti sont inférieures à celles de 2007 mais supérieures à la moyenne interannuelle (1943-1995).

La situation phytosanitaire est calme dans la région.

La campagne de contre saison se caractérise en cette période par le repiquage et l'entretien du riz au niveau de certains PIV. Les réalisations sont inférieures à celles de 2007.

L'évolution des cultures de contre saison de manioc, arachide et niébé se poursuit normalement dans les communes de Korombana (Mopti) et de Diaptodji (Douentza).

Quant aux cultures de décrue de mil/sorgho, les travaux d'installation se poursuivent activement au niveau des mares et lacs à Douentza, Youwarou et Mopti. Les premiers semis sont au stade de levée tallage. Les perspectives de réalisations sont bonnes.

Le maraîchage est presque terminé avec les dernières récoltes en cours. La campagne maraîchère est jugée bonne à moyenne dans la région.

Les préparatifs pour la nouvelle campagne agricole sont en cours à travers les opérations de nettoyage, de transport de fumier et de labour de début de saison dans les rizières.

Les pâturages sont moyennement fournis en cette période. Toutefois, suite aux feux de brousse, d'importants dégâts ont été enregistrés sur le disponible fourrager à travers le cercle de Ténenkou. Les conditions d'abreuvement sont jugées moyennes dans l'ensemble. Toutefois, l'abreuvement se fait au niveau des puits avec des difficultés d'exhaure suite à l'assèchement des eaux de surface dans les zones exondées. L'état d'embonpoint du bétail est partout satisfaisant. Les troupeaux transhumants sont dans les bourgoutières et dans les autres zones habituelles de concentration. La situation épizootique est marquée par des pertes de volaille suite à la maladie de Newcastle à Douentza (Mondoro). Des mesures de police sanitaire sont en cours pour circonscrire le dit foyer.

La pêche se poursuit activement dans les pêcheries à la faveur de la décrue. En cette période de pêche collective, les captures sont en augmentation. Des perturbations dans les opérations de captures sont à déplorer avec des lâchées d'eau du barrage.

Aucun mouvement inhabituel de bras valides ni de ménages n'a été signalé dans la région.

L'approvisionnement des marchés en céréales reste partout suffisant pour la demande. Cependant, la conjoncture est marquée à travers la région par le maintien à des niveaux élevés du prix des denrées alimentaires. Pour le riz et malgré une disponibilité moyenne à importante, la hausse se poursuit particulièrement pour les marchés des chefs lieux de cercle. Pour le mil, la fluctuation est beaucoup moindre avec une tendance à la stabilité voire des baisses par endroits. Le prix du mil est stable à Mopti, Douentza, Ténenkou; en hausse à Bandiagara, Koro et en baisse ailleurs par rapport au mois dernier. Ce niveau de prix est partout supérieur à celui de l'année dernière à la même période. Par rapport à la moyenne interannuelle 2003-2007, il est en hausse à Ténenkou, Douentza; égal à Mopti et en baisse ailleurs dans les autres chefs lieux de cercle.

Le marché à bétail reste animé. Les prix sont en hausse par rapport à l'année dernière même période. Le prix moyen de la chèvre est en baisse à Bandiagara, Bankass, Douentza et en hausse sur les autres marchés par rapport au mois précédent. Par rapport à la moyenne pluriannuelle 2003-2007, il est en baisse à Bankass et en hausse au niveau des autres chefs lieux de cercle.

Les termes de l'échange chèvre/mil sont en amélioration par rapport au mois dernier à Mopti, Djenné, Ténenkou, Youwarou et en détérioration ailleurs au niveau des autres cercles. Comparés à la moyenne inter annuelle 2003-2007, ils sont partout plus favorables aux éleveurs.

Les habitudes alimentaires sont partout normales dans la région.

Les réserves alimentaires familiales sont jugées moyennes dans l'ensemble.

Au niveau des banques de céréales, les opérations de reconstitution se poursuivent par endroits. Les stocks déclarés en fin de mois sont de 1621T7 de mil/sorgho et 66,34T de riz paddy dont 1378,9T pour les banques CSA.

La situation épidémiologique est marquée par 12 cas de méningite dont 0 décès et 24 cas de rougeole dont 0 décès à travers la région.