
SITUATION REGION DE GAO EN JANVIER 2007

La situation alimentaire est assez bonne dans toute la région.

La décrue est amorcée sur le fleuve Niger au niveau de toutes les stations de la région avec un rythme jugé normal. Les côtes relevées en fin de mois sont supérieures à celles de l'année dernière.

La situation phytosanitaire est relativement calme. Cependant les oiseaux granivores provoquent de légers dégâts sur le sorgho de décrue. Par ailleurs, de légers dégâts de chenilles sont signalés sur les cultures maraîchères à Ansongo et Gao.

La récolte de riz est terminée. Elle a été moyenne à assez bonne dans l'ensemble. Cependant des poches de mauvaise campagne sont signalées dans le cercle de Gao et à Bamba dans le cercle de Bourem.

L'évolution des cultures de sorgho de mare est moyenne avec les plants au stade de maturation. S'agissant du maraîchage, les réalisations sont inférieures à celles de l'année dernière.

L'état des pâturages et les conditions d'abreuvement restent bons dans la région. L'état d'embonpoint du cheptel est satisfaisant. La situation épizootique est relativement calme.

Aucun cas de grippe aviaire n'a été signalé. La campagne de vaccination contre les épizooties telles que la PPCB, la dermatose nodulaire, la pasteurellose se poursuit à travers la région.

L'ONG OXFAM GB mène un programme de reconstitution des troupeaux à Ansongo et Ménaka

Les captures de poissons sont en amélioration dans l'ensemble.

Sur les marchés, l'offre en céréales est stable avec des disponibilités partout suffisantes pour la demande. Le prix du mil est stable au niveau des chefs lieux des cercles de Ménaka, Bourem et en baisse à Gao et Ansongo. Il est inférieur à la moyenne des cinq dernières années à Gao, Ansongo, Bourem et égal à Ménaka.

Les effectifs d'animaux présentés à la vente sont stables dans l'ensemble. Le prix moyen des animaux est en baisse sauf à Ménaka où il est reste stable.

Les termes de l'échange chèvre/mil sont en détérioration par rapport au mois précédent à Ansongo et en stabilité à Ménaka. Comparés à la moyenne 2002-2006, ils sont favorables aux éleveurs.

Les habitudes alimentaires sont normales dans la région.

Les réserves alimentaires sont jugées moyennes dans l'ensemble sauf à Ménaka où elles sont faibles.

Les banques de céréales sont quasiment vides.

La situation épidémiologique est calme.