

Synthèse.

SITUATION REGION DE SEGOU EN JUILLET 2007

La situation alimentaire est bonne dans la région.

Les hauteurs mensuelles des pluies sont normales à excédentaires à celles de 2006. Elles sont partout supérieures à celles de 2006 excepté à Macina où elles sont inférieures. Ces quantités importantes de pluies ont provoqué des inondations dans la plupart des cercles de la région et engendré des dégâts matériels importants et 1 perte en vie humaine.

S'agissant du cumul des pluies du 1^{er} mai au 31 juillet 2007, il est déficitaire et inférieur à celui de 2006 à Ségou, Macina et normal à excédentaire dans les autres stations de chef-lieux de cercle.

La crue se poursuit sur le fleuve Niger. Les côtes en fin juillet sont supérieures à celles de l'année dernière à Niono, San, Bla, égales à Ségou et inférieures à Macina.

L'installation de la campagne agricole 2007-2008 a connu un léger retard pour les cultures vivrières et un important retard pour le coton à cause du déficit pluviométrique.

Les semis se poursuivent pour toutes les céréales sèches. Malgré le retard accusé, les superficies réalisées à cette date sont supérieures à celles de la campagne précédente excepté dans les cercles de Bla, San et Tominian où elles sont inférieures. Pour le coton, les semis sont terminés et les réalisations sont nettement en deçà des prévisions. Le stade dominant des cultures pluviales est la levée feuilles et l'aspect végétatif des cultures est bon.

Pour la riziculture de submersion (ORS...), les semis se poursuivent ; les réalisations sont partout inférieures à celles de 2006.

En zone office du Niger, l'évolution est normale avec l'entretien des pépinières de riz irrigué et les repiquages comme activités dominantes.

Malgré le léger retard accusé à cause de l'insuffisance des pluies, l'évolution de la campagne agricole 2007-2008 est jugée moyenne dans l'ensemble.

La situation phytosanitaire reste calme. Cependant, on note la présence d'oiseaux granivores à Macina et Tominian, de chenilles, de sauteriaux et de rongeurs à Macina. Les dégâts sont jugés légers et portent essentiellement sur les pépinières de riz à Macina. Ils sont jugés relativement importants sur les cultures de mil dans la commune de Fangasso dans le cercle de Tominan.

Les pâturages se sont considérablement améliorés à la faveur des pluies enregistrées. Les conditions d'abreuvement sont déjà très bonnes. L'état d'embonpoint du cheptel se restaure progressivement. Les troupeaux transhumants poursuivent leur mouvement en direction des parcours d'hivernage. La situation zoo sanitaire est marquée par une suspicion de pasteurellose bovine signalée à Bola (Katiéna). Des mesures de police sanitaire ont été prises.

Quelques retours habituels des bras valides sont constatés avec des ressources jugées moyennes à faibles.

Sur les marchés, les disponibilités en céréales issues des récoltes locales sont moyennes et partout suffisantes pour la demande. Les prix des céréales sont dans l'ensemble à la hausse par rapport au mois précédent. Toutefois, le niveau du prix du mil reste plus bas qu'en juillet 2006 et nettement inférieur à la moyenne des cinq dernières années.

Les effectifs d'animaux présentés à la vente sont en augmentation à Bla, stables dans les cercles de Ségou, Macina, Tominian, San, Baraouéli et en diminution à Niono. Le prix moyen des animaux est en baisse dans les cercles de Ségou, Macina et San, en augmentation à Baraouéli, Bla et Niono et stable à Tominian.

Les termes de l'échange chèvre/mil sur les marchés des chef-lieux de cercles sont pratiquement en détérioration à Ségou, Macina, Niono, San, en amélioration à Bla et Baraouéli par rapport au mois précédent. Ils sont partout plus favorables aux éleveurs comparés à la moyenne des 5 dernières années.

Les réserves alimentaires familiales sont jugées de moyennes à faibles dans la région. Des stocks communautaires sont disponibles dans la plupart des communes de la région. Le stock constitué au niveau des banques CSA est de 4852 T 200 en mil-sorgho et 895 T de riz.

La situation épidémiologique est marquée par 3 cas de méningite dont 1 décès dans les cercles de Ségou et Baraouéli.