

---

## SYNTHESE DE LA SITUATION MOIS DE JUILLET 2008

### Points Saillants

- Bonne évolution de la campagne agricole 2008-2009 malgré de légers retards observés par endroits notamment dans la région de Mopti.

### Situation alimentaire

La situation alimentaire est caractérisée par une disponibilité suffisante de céréales (mil, sorgho, riz) sur les principaux marchés malgré une légère diminution des quantités par rapport au mois dernier. Toutefois, la hausse des prix des mil- sorgho qui se généralise rend l'accessibilité à la céréale de plus en plus difficile pour les populations à faibles revenus. Cependant, la mise en œuvre de la recommandation de l'Offre Publique de Vente par l'OPAM et la mise en vente des stocks communautaires (banques de céréales CSA) contribuent à freiner l'allure de la hausse des prix des céréales sèches.

### Pluviométrie et Crue/Décru des fleuves

La hauteur mensuelle de pluies recueillies est dans l'ensemble normale à largement excédentaire excepté dans la région de Gao où elle est très déficitaire. Elle est globalement supérieure à celle de la campagne dernière dans les stations de chefs lieux de cercle. La répartition des pluies dans le temps et dans l'espace est jugée bonne sauf à Mopti où des poches de déficit ont été observées.

Le cumul des pluies du 1<sup>er</sup> mai au 31 juillet 2008 est de normal à largement excédentaire sauf dans les stations de Diéma, Sikasso, Barouéli, San, Youvarou, Tombouctou, Ansongo et Bourem où il est déficitaire à très déficitaire. Les déficits les plus importants sont observés dans les stations de Youvarou, Ansongo et Barouéli.

La pluviométrie cumulée au 31 juillet 2008 est dans l'ensemble supérieure à celle de la campagne précédente sauf dans les régions de Sikasso, Mopti, Tombouctou, Gao où elle est inférieure.

La situation hydrologique est caractérisée par la poursuite de la montée de niveau sur tous les cours d'eau à l'exception du Niger à Kirango Markala et du Sénégal à Kayes. Les niveaux

d'eau relevés sont partout supérieurs à ceux de 2007 à la même période.

### Déprédateurs

La situation phytosanitaire est relativement calme. Toutefois, on signale :

- des éclosions de larves de sautériaux dans les bandes nord des régions de Kayes, Koulikoro, dans les cercles de Macina et San (Ségou) et sur le plateau Dogon à Mopti, de coléoptères à Bougouni (Sikasso), causant de légers dégâts sur les jeunes pousses;

- la présence de chenilles défoliatrices sur les pépinières de riz à Niono et de coléoptères sur les cucurbitacées dans la zone lacustre de Tombouctou ;

- et la présence d'oiseaux granivores dans les cercles de Macina, Bla (Ségou), dans les zones inondées de Mopti, Tombouctou et dans la région de Gao. Les dégâts sur les cultures sont légers pour l'instant. Cependant, la situation est jugée préoccupante pour les exploitants de riz de contre saison dont les cultures sont à la maturation dans les PIV. Des luttés sont en cours pour limiter les dégâts ;

- et des rongeurs et singes causant de légers dégâts sur les cultures à Keniéba (Kayes).

La situation du criquet pèlerin reste calme.

### Campagne agricole.

La campagne de contre saison de riz est pratiquement terminée dans les zones ON, à l'ODRS et dans les périmètres irrigués de San-Ouest et Maninkoura avec des productions supérieures à celles de 2007. Elle se poursuit toujours dans les PIV des régions de Mopti, Tombouctou et Gao où les cultures sont en général au stade de maturation.

Au titre de la campagne agricole 2008-2009, les semis sont terminés pour le maïs, le coton et le fonio et se poursuivent normalement pour les mil, sorgho, riz de bas fonds, arachide, niébé...

Les réalisations en céréales et légumineuses sont partout supérieures à celles de l'année dernière à la même période sauf dans le cercle de Kadiolo où elles sont inférieures. Par contre, les réalisations en coton sont globalement inférieures à celles de 2007 et sont loin d'atteindre les prévisions. Le développement des cultures est normal avec les céréales en général au stade de tallage- montaison au sud du pays et levée-tallage dans le reste du pays.

Pour la riziculture irriguée, l'entretien des pépinières et le repiquage se poursuivent activement. Les superficies repiquées en zone O.N sont à présent nettement supérieures à celles de l'année dernière et cela grâce à la disponibilité de l'engrais dans le cadre de l'initiative riz. Pour le riz de submersion, les labours et semis se poursuivent normalement dans les plaines avec des réalisations également supérieures à celles de 2007.

S'agissant de l'initiative riz, les superficies réalisées en riz NERICA ont progressé ce mois-ci mais elles sont encore loin d'atteindre les prévisions. Actuellement l'engrais est disponible dans le cadre de ce programme, mais on signale une insuffisance notoire d'urée dans les zones CMDT qui risque d'affecter la culture de maïs.

L'installation des cultures est pratiquement à terme pour les principales spéculations de décrue avec des perspectives également bonnes à Mopti et Tombouctou.

La physionomie de la campagne agricole 2008-2009 est globalement bonne dans le pays. Toutefois, dans la région de Sikasso, le manque d'urée, l'enherbement des champs du à l'accès difficile aux herbicides et les mouvements des bras valides vers les sites d'orpaillage risquent de compromettre la production céréalière notamment de maïs dans certaines zones si des dispositions urgentes ne sont pas prises.

### **Elevage et Pêche**

Les pâturages sont déjà bien fournis dans le sud du pays. Au nord, ils sont également en amélioration avec l'amorce de la régénération du couvert végétal mais leur état demeure encore moyen à mauvais dans l'ensemble. Partout, les conditions d'abreuvement sont bonnes à la faveur des pluies tombées. Les mouvements habituels des troupeaux transhumants vers les pâturages de saisons de pluies se poursuivent tandis que les sédentaires sont sous gardiennage dans les campements d'hivernage. L'état d'embonpoint des animaux est bon dans le sud et moyen à mauvais suivant les parcours dans le nord. La situation épizootique est marquée par une suspicion:

- de fièvre aphteuse dans les cercles de Kadiolo et Yanfolila ;
- de peste de petits ruminants à Kolondiéba ;

- et pasteurellose bovine dans le cercle de San. Des mesures de police sanitaire ont été prises.

La campagne de vaccination contre la pasteurellose bovine, ovine, caprine et le charbon symptomatique a démarré.

Dans le domaine de la pêche, la phase active tire à sa fin suite à la montée des eaux et les captures sont en diminution par rapport au mois précédent.

### **Migrations**

Des départs inhabituels de bras et de ménages sont signalés dans les cercles de Kadiolo et Kolondiéba en direction des sites d'orpaillage au détriment des travaux agricoles. Par ailleurs dans les zones agricoles, les retours habituels des bras valides pour les travaux champêtres se poursuivent avec de faibles ampleurs.

### **Marchés**

Sur les marchés l'offre en céréales poursuit une diminution à travers l'ensemble des régions. L'offre publique de vente par l'OPAM contribue à améliorer la disponibilité en céréales sèches. Les disponibilités physiques sont de faibles à moyennes mais restent suffisantes pour la demande sur les principaux marchés. Le prix des mil/sorgho poursuit une hausse sur la quasi-totalité des marchés de chefs-lieux des cercles sauf dans les régions de Sikasso et Kidal où la prédominance reste la stabilité par rapport au mois précédent. Le niveau de prix du mil-sorgho est nettement supérieur à celui de juillet 2007 sauf dans la région de Kidal où il reste en stabilité. Ce niveau est également en hausse sensible par rapport à la moyenne des cinq dernières années sur les marchés des chefs-lieux des cercles. Au sujet du riz, le niveau observé du prix reste inhabituellement élevé à cause principalement du contexte international de flambée des prix des produits alimentaires.

Les effectifs d'animaux présentés à la vente sont en augmentation dans les zones agricoles (à cause des besoins pécuniaires l'achats d'intrants agricoles), au niveau des marchés à proximité des zones de concentrations des troupeaux transhumants et en diminution ailleurs. Le prix moyen des animaux est à la hausse par rapport au mois précédent sur la majorité des marchés des chefs-lieux des cercles excepté celui de la chèvre en diminution dans les régions de Gao et Kidal. Le prix moyen de la chèvre reste dans l'ensemble supérieur à la moyenne des 5 dernières années.

Les termes de l'échange chèvre- mil sont en détérioration par rapport au mois passé sur la grande majorité des marchés des chefs-lieux des cercles. Comparés à la moyenne des cinq dernières années, ils sont en légère amélioration dans les régions de Kayes, Koulikoro, Tombouctou, Gao, pratiquement stables dans celles de Mopti, Kidal et en détérioration dans la région de Ségou.

### **Habitudes alimentaires**

Les habitudes alimentaires sont normales.

### **Réserves Alimentaires**

Le niveau des réserves alimentaires familiales reste moyen à faible suivant les communes excepté dans les régions de Gao et Kidal où il est faible.

Au niveau des stocks communautaires les quantités déclarées en banque CSA sont de 865,201 T de céréales pour la région de Kayes; 1.102,574 T en mil, sorgho, maïs et de 9 T de riz pour la région de Koulikoro; 1.955,549 T de céréales sèches pour Sikasso; 1042 T 997 de mil/sorgho et 9T55 de riz gambiaka à Ségou; 1.328,27 T de mil/sorgho et 102,415 T de paddy pour la région de Mopti; 290,500 T de mil/sorgho et 57,600 T de riz pour la région de Tombouctou; 151,260 T de céréales (mil et riz) pour celle de Gao. De faibles stocks non quantifiés sont déclarés disponibles dans les cercles de Kidal et Tessalit (Kidal). Les ventes sont débutées au niveau de ces stocks.

Le PAM a livré au cours du mois 162,400 T de vivres en VCT/VCF dans la région de Gao et 295,599 T (mil, petit pois, farines enrichies, huile et sucre) en appui à la santé/nutrition dans les régions de Kayes et Gao.

### **Santé/ Nutrition**

La situation épidémiologique est marquée par :

- 9 cas de méningite dont 1 décès dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti;
- un (1) cas de tétanos néonatal dont 0 décès dans la région de Kayes.
- 2 cas de paralysie flasque aigue dont 0 décès dans la région de Kayes.
- et 1 cas de fièvre jaune dont 0 décès dans la région de Kayes.

De nombreux cas de paludisme dont 0 décès signalé dans la région de Kidal.

Sur le plan nutritionnel, 29 cas d'enfants malnutris aigus dont 1 décès sont signalés dans les régions de Sikasso et Kayes.

### **Faits Exceptionnels**

Au cours du mois, des pluies diluviennes ont causé d'importants dégâts matériels dans les communes de Kokofala (Kita), Dialakoroba (Kati) et Niala (Bla). Il n'y a pas eu de perte en vie humaine.