

SITUATION REGION DE SEGOU JUILLET 2008

La situation alimentaire est globalement satisfaisante.

La hauteur mensuelle des pluies recueillies et le cumul du 1^{er} mai au 31 juillet 2008 sont normaux à excédentaires sauf à San où ils sont déficitaires et à Barouéli où ils sont très déficitaires. Cependant, la pluviométrie est jugée partout suffisante pour les besoins des cultures et des pâturages. Comparés à juillet 2007, la hauteur mensuelle est globalement plus faible et le cumul plus élevé.

La crue se poursuit sur le Bani et le Niger avec des côtes largement supérieures à celles de juillet 2007.

La situation phytosanitaire est marquée par la présence d'oiseaux granivores à Macina, Bla, de sautériaux à San, Macina et de chenilles sur les pépinières de riz à Niono. Les dégâts causés sur les cultures sont jugés légers.

La campagne de contre saison de riz est pratiquement bouclée dans la zone ON et dans la plaine rizicole de San. Les superficies récoltées et les productions obtenues sont supérieures à celles de 2007. Au titre de la phase de saison, l'entretien des pépinières et le repiquage se poursuivent activement. Les superficies repiquées sont à présent nettement supérieures à celles de l'année dernière à la même période. Cependant, la campagne accuse un léger retard à M'Bêwani et à Macina. L'évolution de la campagne est bonne dans l'ensemble surtout avec l'accès facile à l'engrais de l'Initiative Riz.

Pour le riz de submersion, les semis sont également en cours dans la zone ORS et dans les plaines rizicoles de San et Bla. Le niveau de réalisation dans la zone ORS est nettement supérieur à celui de juillet 2007 (29% des prévisions contre 9 % en 2007).

Pour le riz NERICA, les réalisations sont faibles à cause de l'insuffisance des pluies.

S'agissant des cultures sèches, les semis se poursuivent pour toutes les spéculations sauf le maïs. Les superficies mises en valeur sont en augmentation dans tous les cercles excepté Macina et Niono où les populations s'investissent surtout dans la culture de riz. Les premiers semis de mil, sorgho, riz de bas fonds sont au stade de levée à début tallage et le maïs en début montaison.

Pour le coton, les superficies réalisées sont en augmentation par rapport à celles de la campagne précédente. Toutefois, elles restent largement inférieures aux prévisions et le cercle de Bla avec 57 % a le taux le plus élevé.

L'évolution d'ensemble de la campagne agricole 2008-2009 est bonne dans la région, nettement meilleure à celle de 2007-2008.

Les pâturages herbacés et aériens sont assez bien fournis. Les conditions d'abreuvement sont bonnes avec la reconstitution des eaux de surface. L'état d'embonpoint du cheptel est satisfaisant. Les troupeaux sont actuellement dans les parcours d'hivernage. La situation zoo sanitaire est marquée par une suspicion de pasteurellose bovine dans le cercle de San. La campagne de vaccination contre la pasteurellose bovine, ovine, caprine et le charbon symptomatique est en cours dans les cercles de Barouéli, San et Bla.

Dans le domaine halieutique, la phase active tire à sa fin suite à la montée des eaux.

Des retours sporadiques de bras valides sont encore observés à travers la région.

Les marchés sont suffisamment approvisionnés en céréales locales quoique les quantités offertes soient en diminution par rapport à celles du mois dernier. Malgré la bonne disponibilité, la hausse des prix se poursuit sur tous les marchés et pour toutes les céréales. Le niveau du prix du mil est partout nettement supérieur à celui de juillet 2007 et à la moyenne des cinq (05) dernières années.

Les effectifs d'animaux présentés à la vente sont stables ou en augmentation sur les principaux marchés par rapport au mois dernier. Le prix moyen de la chèvre au niveau des chefs-lieux de cercle est en baisse à Ségou, Bla, Tominian et en hausse ailleurs par rapport au mois précédent. Il est en baisse à Ségou, en hausse Niono et Macina par rapport à la moyenne 2003-2007.

Les termes de l'échange chèvre/mil sur les marchés des chefs-lieux de cercle sont partout en détérioration sauf à Barouéli où ils sont en amélioration. Ils sont partout plus défavorables aux éleveurs comparés à la moyenne des 5 dernières années.

Les réserves alimentaires familiales sont jugées de moyennes à faibles dans la région.

Le stock constitué au niveau des banques CSA est de 4671T en mil et sorgho et 2675 T de riz.Gambiaka. La vente des stocks a commencé.

La situation épidémiologique est marquée par 2 cas de méningite dont 0 décès.

En faits exceptionnels, des pluies diluviennes ont provoqué des dégâts importants dans le cercle de Bla.