

SYNTHESE SITUATION PAR INDICATEURS EN FIN MAI 2007

Situation alimentaire

La situation alimentaire est satisfaisante dans le pays. Toutefois, les pasteurs traversent comme d'habitude leur période de soudure normale caractérisée par de faibles disponibilités alimentaires (céréales et lait) et des termes d'échange chèvre- mil qui leur sont toutefois plus favorables cette année comparativement à l'année dernière et à la moyenne des 5 dernières années .

Pluviométrie et Crue/Décrue des fleuves

L'installation de la saison des pluies est timide dans le sud du pays. Les hauteurs d'eau enregistrées sont dans l'ensemble déficitaires et inférieures à celles de l'année dernières à la même période.

Sur le plan hydrologique, la baisse des niveaux d'eau se poursuit de façon générale. Toutefois une hausse des niveaux est constatée sur le Bani et le Niger suite aux lâchées d'eau des barrages de Markala et de Talo.

Déprédateurs

La situation phytosanitaire est relativement calme dans le pays. Toutefois, on signale :

- des dégâts légers de rats, vers, chenilles et oiseaux sur les cultures de décrue à Tombouctou (traitements ont lieu) ,
- la présence massive d'oiseaux granivores dans les niches écologiques avec menace de dégâts sur le riz de contre saison notamment dans la zone ON.

Campagne agricole.

Les cultures de riz de contre saison sont en stade de maturité- récolte en zone ON, ODRS, OPIB avec des perspectives de productions moyennes.. Au niveau des PIV, les cultures sont à des stades assez hétérogènes étalées de tallage à épiaison dans les régions de Mopti, Tombouctou et Gao. Les préparatifs pour les pépinières sont en cours au titre de la phase hivernale.

Dans le cercle de Goundam, la récolte du maïs de contre saison est en cours avec de bons résultats.

Les préparatifs de la nouvelle campagne agricole se poursuivent. Les activités dominantes demeurent le nettoyage des champs, le transport des fumures organiques, les labours de début de saison pour la riziculture. Des cas de semis à sec sont signalés dans la région de Mopti tandis que des semis sporadiques sous pluies de mil, de maïs, de riz de bas fonds sont constatés dans la région de Sikasso. La mise en place des intrants pour le coton est en cours dans les zones CMDT et OHVN.

Dans les zones de décrue, l'installation des cultures se poursuit dans les régions de Mopti et

Tombouctou. Les réalisations sont plus importantes que celles de l'année dernière dans la région de Tombouctou mais encore inférieures dans la région de Mopti à cause du retard dans le retrait des eaux. Les premiers plants sont au stade tallage pour les mil/sorgho/riz et la ramification pour les arachides et niébé. Les cultures présentent un bon aspect végétatif.

Eleavage et Pêche

Les pasteurs traversent en ce moment leur période de soudure. En effet, le disponible fourrager est très réduit avec des points d'eau rares et s'éloignant des pâturages dans les zones exondées. Cependant, cette situation reste normale pour la période. Dans le sud du pays, on signale un début de régénération du couvert végétal suite aux premières pluies. Dans l'ensemble, l'état d'embonpoint du cheptel est satisfaisant pour la période.

La situation zoo sanitaire calme. Toutefois, on signale une suspicion de clavelée à Adielhoc (Tessalit) et de charbon à Tin- Essako dans la région de Kidal. On signale également des cas de parasitose à Adielhoc et de gale à Tin- Essako.

La pêche reste toujours active avec les pêches collectives des mares et lacs. Les captures de poissons sont en amélioration dans l'ensemble. Toutefois, les lâchées d'eau ont réduit les captures dans la région de Mopti.

Migration

Les retours habituels des bras valides sont amorcés en vue de participer aux travaux champêtres. Dans les sites aurifères du cercle de Kadiolo, on observe des mouvements de bras valides et de ménages d'un site minier à un autre.

Marchés

Les marchés sont partout suffisamment approvisionnés en céréales avec des disponibilités stables par rapport au mois dernier. Les prix pratiqués pour les céréales sèches sont globalement stables par rapport au mois dernier et inférieurs à ceux de mai 2006 excepté quelques marchés de Kayes où ils y sont supérieurs ou égaux. Comparés à la moyenne des 5 dernières années, ils sont partout nettement inférieurs.

Quant au prix du riz, on observe une légère évolution saisonnière à la hausse par rapport au mois passé.

Sur les marchés à bétail, les effectifs d'animaux présentés à la vente sont globalement stables excepté dans la région de Sikasso où elles en augmentation en raison probablement des besoins financiers de la nouvelle campagne étant donné que le coton n'avait réussi en 2006-2007. La tendance

Synthèse.

générale des prix est la hausse pour le bœuf (pour les besoins de trait) et la baisse pour la chèvre.

Les termes de l'échange chèvre/mil sont globalement en détérioration (lié surtout à la baisse du prix de la chèvre) par rapport au mois passé et partout plus favorables aux éleveurs comparés à la moyenne (2002-2006).

Habitudes alimentaires

Aucun changement d'habitude alimentaire n'est signalée au cours du mois.

Réserves alimentaires

Les niveaux des réserves alimentaires familiales sont jugés importants dans les grandes zones de production, moyens à faibles ailleurs et satisfaisants dans l'ensemble.

Les stocks communautaires sont pratiquement reconstitués. Les quantités déclarées sont de 695T334 de mil sorgho à Kayes, 8392 T à Koulikoro, 2073T669 de mil- sorgho- maïs à Sikasso, 2010 T de mil et riz à Mopti, 299,8 T de mil-riz à Tombouctou et 209,7903 T de mil-riz à Gao.

Le PAM a distribué au cours du mois 127,3 T en VCT/VCF dans la région de Kayes, 176,3 T de farine enrichie et 17,624 litres d'huile à 44 CSCOM dans la région de Sikasso et 966,286 T de vivres en VCT/VCF dans le cadre de ses programme Pays et PRRO,

L'ONG CRS a distribué en VCF 1400 T de mil/sorgho dans le cercle de Douentza (Mopti).

L'ONG OXFAM a distribué 511 T de vivres à 36 cantines scolaires dans la région de Gao

Le commissariat à la sécurité alimentaire a distribué gratuitement au cours du mois 630T de mil/sorgho dans les communes en difficultés alimentaires de la région de Kayes et 113,4 T dans le cercle de Tombouctou.

Santé- Nutrition

La situation épidémiologique est marquée par 66 cas de méningite dont 4 décès contre 155 cas dont 8 décès le mois passé. Toutes les régions sont touchées excepté Gao. On signale également 1 cas de fièvre jaune dont 0 décès dans la région de Koulikoro.