

SITUATION REGION DE MOPTI EN MAI 2008

La situation alimentaire est normale dans la région.

Des pluies précoces ont été enregistrées un peu partout à travers la région annonçant l'hivernage.

La décrue se poursuit sur les cours d'eau. Les côtes relevées sur le Niger et le Bani à Mopti sont supérieures à celles de mai 2007 et à la moyenne interannuelle 1943-1995 suite aux lâchées d'eau du barrage de Sélingué et du seuil de Talo.

La situation phytosanitaire est calme dans l'ensemble. Toutefois d'importantes colonies d'oiseaux granivores sont signalées au nord- Est dans les cercles de Ténenkou et Youwarou.

Sur le plan agricole, les préparatifs de la nouvelle campagne se poursuivent avec les labours de début de saison pour le riz de submersion, le nettoyage des parcelles et l'épandage des fumures organiques pour les cultures sèches.

La physionomie de la campagne de contre de saison est bonne dans l'ensemble quoique les réalisations soient inférieures à celles de l'année dernière. Ces réductions de superficies sont consécutives à l'installation tardive des plants suite aux pannes de motopompes mais aussi et surtout à la défectuosité des aménagements.

En revanche, pour les cultures de décrue, les réalisations sont supérieures à celles de l'année dernière. Les opérations d'installation sont pratiquement terminées et les plants sont au stade de tallage- montaison pour les mil/sorgho et ramification pour les légumineuses.

Les conditions générales d'élevage sont moyennes dans l'ensemble caractérisées par un début de régénération du couvert végétal par endroits et de remplissage des plans d'eau naturelle grâce aux précipitations enregistrées.

Dans l'ensemble, l'état d'embonpoint des animaux est satisfaisant et les regroupements des troupeaux dans les bourgoutières sont coutumiers. Le foyer de New Castle signalé à Mondoro, cercle de Douentza, le mois dernier a été circonscrit. Par conséquent la situation épizootique est calme à travers la région.

La pêche se poursuit normalement dans la région.

Des perturbations dans les mouvements des poissons sont toujours constatées avec des lâchées d'eau observées sur le Niger et le Bani diminuant les captures par endroits.

Concernant la mobilité des populations actives, on assiste à l'amorce des retours d'ampleur faible de bras valides pour la nouvelle campagne agricole. Les ressources rapportées sont jugées faibles à moyennes.

Sur les marchés, l'état d'approvisionnement en céréales reste suffisant dans la région. Les disponibilités physiques sont globalement moyennes et les quantités proposées à la vente stables par rapport au mois passé. Le prix du mil est fluctuant suivant les marchés par rapport au mois passé. Ce niveau de prix est partout nettement supérieur à celui de mai 2007. Par rapport à la moyenne mensuelle interannuelle, il est plus élevé à Mopti, Bankass, stable à Youwarou et inférieur partout ailleurs. Pour le riz, l'augmentation du prix se poursuit sur la plupart des marchés.

Les effectifs d'animaux présentés à la vente sont dans l'ensemble stables. Les prix moyens sont en baisse dans l'ensemble pour les petits ruminants et en augmentation pour les bovins par rapport au mois précédent. Par rapport à mai 2007, les prix des animaux sont globalement plus élevés.

Les termes de l'échange chèvre/mil sont en augmentation par rapport au mois passé à Bandiagara, Douentza et Ténenkou et en détérioration ailleurs. Comparés à la moyenne mensuelle interannuelle 2003-2007, ils sont partout nettement favorables aux éleveurs.

Les habitudes alimentaires demeurent normales dans la région.

Les stocks alimentaires familiaux sont jugées faibles à moyens dans l'ensemble.

Pour les stocks communautaires, 1 659T790 de mil/sorgho et 115T815 de riz paddy dont 1 410T705 ont été signalées dans les banques CSA.

La situation épidémiologique est marquée par 08 cas de méningite dont 0 décès et 02 cas de rougeole dont 0 décès dans la région.