

## SITUATION PAR INDICATEURS EN NOVEMBRE 2007

### Situation alimentaire

En cette période de récolte, la situation alimentaire est bonne dans l'ensemble du pays.

### Pluviométrie et Crue/Décruie des fleuves

La situation hydrologique est caractérisée par la poursuite de la décrue sur les cours d'eau à exception du Niger en aval de Diré où la crue se poursuit. Par ailleurs, on signale également la poursuite de la crue dans les mares et lacs dans le delta central du Niger.

Les niveaux d'eau relevés au 30 novembre 2007 sont proches de ceux de novembre 2006 sauf sur le Niger à partir de Tombouctou où ils sont supérieurs. Ils restent inférieurs à la moyenne inter annuelle sur le Sénégal à Kayes, sur le Niger et le Bani à Mopti.

### Déprédateurs

La situation phytosanitaire est dominée par la présence massive d'oiseaux granivores dans les zones habituelles de concentration causant des dégâts légers sur le sorgho « gadiaba » en maturation dans le nord des régions de Kayes, Koulikoro et sur le riz en zone inondée de la région de Mopti. Les traitements aériens effectués ou en cours dans les régions de Mopti, Tombouctou et Gao sont jugés insuffisants.

De légères attaques d'insectes terricoles sur les cultures maraîchères sont signalées dans les régions de Kayes et Koulikoro. Aussi, la présence des cochenilles est constatée sur les manguiers dans la région de Sikasso et un traitement s'avère nécessaire.

### Campagne agricole.

Les récoltes se poursuivent pour les cultures pluviales et de décrue. Les opérations de battage des céréales ont également démarré par endroits. Les perspectives de production restent bonnes à moyennes dans l'ensemble. Toutefois, des poches de baisse de production sont observées çà et là dans la plupart des régions agricoles du pays.

La récolte du coton est également en cours et l'on s'attend à une production de coton nettement en deçà de celle de 2006.

En riziculture, les cultures sont aux stades d'épiaison à maturation avec un bon aspect végétatif. L'évolution de la campagne rizicole est de bonne à moyenne suivant les zones.

S'agissant de la contre saison, dans la région de Kayes les semis de maïs- sorgho se poursuivent. Les réalisations sont en augmentation par rapport à la campagne passée et les premières cultures sont au stade de montaison avec un bon aspect végétatif. Dans la région de Tombouctou, les préparatifs des parcelles et la mise en cultures (blé, orge, cumin) sont

amorcés. Les prévisions de superficies sont supérieures à celles de la campagne dernière.

La campagne maraîchère a démarré à travers le pays avec l'installation des pépinières, la préparation des sols et le début des repiquages. Les perspectives s'annoncent bonnes excepté 2 communes de Bandiagara victimes de décapage des terres lié aux inondations et dans lesquelles des opérations de restauration se réalisent péniblement par les exploitants.

L'évolution d'ensemble de la campagne agricole 2007-2008 se confirme bonne à moyenne pour les céréales (mil, sorgho, riz) et moyenne à mauvaise pour le coton.

### Elevage et Pêche

L'état des pâturages et les conditions d'abreuvement sont bons dans l'ensemble. Le disponible fourrager est actuellement renforcé par les résidus des champs dans les zones exondées. Cependant, les feux de brousse ont causé des dégâts sur les pâturages çà et là dans les zones pastorales. Les troupeaux transhumants ont amorcé leur retour vers sur les parcours de saison sèche. On note des concentrations habituelles autour des champs pour les résidus des récoltes et dans les zones d'attente. On assiste également aux premières traversées des animaux pour rejoindre les bourgoutières du delta central à Mopti. Les animaux présentent un état d'embonpoint satisfaisant.

La situation épizootique est marquée par :

- des cas de suspicion de peste des petits ruminants à Garalo et de la péripneumonie contagieuse bovine à Manankoro (Sikasso),
- de peste caprine et de pasteurellose ovine à Sibila (Ségou).
- et de la PPCB à Tacharane (Gao) sur un effectif contaminé de 470 bovins dont 19 malades, 08 morts et 01 abattu.

La campagne de vaccination contre la péripneumonie et la peste des petits ruminants se poursuit à travers le pays. Les foyers de dermatose nodulaire signalés le mois dernier dans les régions de Mopti et Tombouctou ont été circonscrits avec la vaccination au dermapox.

Au niveau de la pêche, les captures sont en nette amélioration avec la décrue. Les perspectives de pêche sont bonnes dans l'ensemble et particulièrement au niveau du seuil de Talo (Bla).

### Migrations

Aucun mouvement inhabituel de population n'est signalé. Les départs habituels de bras valides et ménages se poursuivent en direction des zones de récolte et des centres urbains du pays et à l'extérieur.

## **Marchés**

Les marchés sont bien approvisionnés dans l'ensemble en céréales d'origine locale et /ou autres. Les quantités offertes sont en légère augmentation par rapport au mois passé. Quant aux prix des mil/sorgho, malgré quelques baisses observées notamment à Mopti et Koulikoro, la tendance générale reste la hausse contrairement à l'année dernière où la baisse était déjà visible. Ce qui fait que les niveaux sont demeurés globalement supérieurs à ceux de novembre 2006 mais nettement inférieurs à ceux de la moyenne inter annuelle 2002-2006. Il est à noter également que le prix du maïs est particulièrement plus élevé qu'en 2006 en raison d'une production prévisible en dessous des attentes. Les effectifs d'animaux présentés à la vente sont stables pour les gros ruminants et en augmentation pour les petits ruminants en raison de la fête de Tabaski. Les prix moyens des animaux sont en hausse dans l'ensemble. Celui de la chèvre est également en hausse par rapport au mois passé. Les termes de l'échange chèvre- mil sont dans l'ensemble, en amélioration par rapport au mois passé. Comparés à la moyenne des cinq dernières années, ils sont plus favorables aux éleveurs excepté à Ségou où ils restent défavorables

## **Habitudes alimentaires**

Elles demeurent normales pour la période.

## **Réserves Alimentaires**

Les réserves familiales sont en reconstitution avec les nouvelles récoltes en cours.

Les banques de céréales s'apprêtent à la reconstitution de leurs stocks dont le niveau avait baissé à la période de soudure.

Le PAM a distribué au cours du mois 165T15 de mil, 168T40 de farine de maïs, 40T65 de farine CSB, 14T322 d'huile et 3T05 de sucre à Kayes, 64T200 de vivres à Gao et 5 T de farine à Kidal.

## **Santé/ Nutrition**

La situation épidémiologique est marquée par :

- 16 cas de méningite dont 3 décès dans les régions de Kayes, Sikasso et Mopti.
- 2 cas de diarrhées dont 0 décès et 3 de paralysie flasque à Kayes ;
- des cas de malnutrition aigue modérée et sévère signalés par les centres de santé à Kayes et Koulikoro;
- et des intoxications alimentaires de 342 personnes dont 0 décès suite à la consommation de poisson « tinèni » dans la commune de Koro (Mopti).