

SITUATION REGION DE MOPTI EN SEPTEMBRE 2007

La situation alimentaire est normale dans l'ensemble des cercles.

La situation pluviométrique s'est caractérisée par une raréfaction à partir de la 2^{ème} décennie du mois. La hauteur mensuelle est de déficitaire à très déficitaire sauf à la station de Mopti où elle est normale et Bankass où elle est excédentaire. Elle reste inférieure à nettement inférieure à celle de septembre 2006 sauf au niveau des stations de Mopti, Bankass et Koro où elle l'avoisine. Quant au cumul du 1^{er} mai au 30 septembre, il est de normal à largement excédentaire sauf à Douentza où il est légèrement déficitaire. Il est de proche à nettement supérieur à celui de l'an passé excepté Ténenkou, Douentza et Bandiagara où il est inférieur.

La montée des eaux se poursuit sur le Bani et le Niger. Les côtes enregistrées à Mopti sont supérieures à celles de 2006 et à la moyenne interannuelle (1943-1995) sur les deux cours d'eau. Le niveau d'eau augure de bonnes perspectives pour la pêche et les cultures de décrue.

La situation phytosanitaire est marquée par des dégâts d'ampleurs faibles à moyennes sur cultures par des sautériaux, chenilles et coléoptères dans les cercles de Mopti, Bandiagara, Douentza et Koro. Des traitements chimiques contre les sautériaux par les services de la Protection des Végétaux et des battus physiques, dénichages et gardiennage par les paysans ont été menées dans les cercles de Bankass, Youvarou et Ténenkou.

L'évolution d'ensemble de la campagne agricole 2007-2008 est de moyenne à bonne selon les cercles pour les cultures sèches et assez bonne pour la riziculture. En effet les cultures pluviales sont affectées par des déficits hydriques plus ou moins prononcés suivant les communes à travers l'ensemble de la région tandis que les cultures de mil/sorgho sont encore aux stades étalés de l'épiaison à la maturation et celles de fonio et des légumineuses (niébé, woandzou, arachide) à la maturité- récolte. Aussi il y a lieu de procéder à des pluies provoquées.

En riziculture, le développement des cultures est normale et l'aspect végétatif des cultures bon avec les plants au stade du tallage- montaison. Des pertes de superficies récoltables sont enregistrées à cause des déficits pluviométriques, des inondations et des ennemis de cultures. Elles

sont estimées à 6% et 10% respectivement pour les cultures pluviales et la riziculture.

L'état des pâturages et les conditions d'abreuvement sont bons dans l'ensemble des cercles. L'état d'embonpoint du cheptel est également bon. Les troupeaux transhumants poursuivent leur séjour habituel pour la période, dans les pâturages d'hivernage notamment du Méma, du Séno ou du Bobori. La situation épizootique est calme et la production laitière encore bonne.

Pour la pêche, les prises de poissons restent toujours faibles en cette période de hautes eaux.

Dans le cadre de la migration, les départs habituels de bras valides en direction des centres urbains du pays et des pays voisins sont signalés

Sur les marchés, l'offre en céréales est en augmentation par rapport au mois dernier au niveau des zones pourvoyeuses avec la poursuite des déstockages des réserves familiales. Les disponibilités en céréales sont de moyennes à importantes suivant les marchés sauf dans les cercles de Bandiagara, Djenné et Youvarou où elles sont de faibles à moyennes mais partout suffisantes pour la demande. Le prix du mil est en baisse par rapport au mois précédent au niveau des marchés des chefs-lieux des cercles excepté à Mopti et Bandiagara où l'on note une stabilité. Il est nettement plus bas que celui de septembre 2006 et à la moyenne mensuelle 2002-2006.

Les effectifs d'animaux présentés à la vente restent dans l'ensemble en stabilité par rapport au mois précédent. Les prix pratiqués se maintiennent élevés à travers la région. Le prix moyen de la chèvre est globalement en hausse par rapport au mois passé.

Les termes de l'échange chèvre- mil sont en amélioration par rapport au mois passé sauf sur les marchés de Bandiagara et Ténenkou où ils sont en détérioration. Comparés à la moyenne des cinq dernières années, ils sont plus favorables aux éleveurs excepté à Bankass où ils restent défavorables.

Les réserves alimentaires familiales sont jugées toujours de moyennes à faibles selon les cercles à travers la région.

Les stocks communautaires déclarés sont de 1415,133 T de mil/sorgho et de 50,8 T de paddy dans la région.

La situation épidémiologique est marquée par 2 cas de méningite dont 0 décès dans les cercles de Mopti et Bandiagara.