

SITUATION PAR INDICATEURS EN SEPTEMBRE 2007

Situation alimentaire

La situation alimentaire est satisfaisante dans le pays à la faveur :

- des bonnes disponibilités de céréales sur les marchés offertes à des prix relativement stables
- des premières récoltes de maïs et fonio
- et de la bonne disponibilité laitière dans les zones pastorales.

Pluviométrie et Crue des fleuves.

L'installation tardive des pluies, la surabondance de celles-ci du 20 juillet au 31 août et surtout leurs insuffisances en septembre ont caractérisé la saison pluvieuse 2007.

En septembre, moins d'un quart des stations de chefs lieux de cercle ont enregistré une situation pluviométrique normale à excédentaire et cela principalement dans les régions de Kayes et Sikasso. Des proches de stress hydrique ont été constatées çà et là à travers le pays.

Malgré ce déficit en septembre, la situation pluviométrique cumulée du 1^{er} mai au 31 Septembre 2007, reste normale à excédentaire sauf à Ségou où elle est légèrement déficitaire. Elle est globalement supérieure à celle de l'année dernière à la même période.

La décrue est amorcée dans les hauts bassins Sénégal et du Niger. La montée se poursuit sur le Niger en aval de Bamako. Les niveaux d'eau relevés sont supérieurs à ceux de septembre 2006 sauf sur le Niger à Gao où ils sont encore inférieurs.

Déprédateurs

La situation phytosanitaire est marquée par des attaques de cantharides, sautériaux, de chenilles et pucerons sur les cultures çà et là à travers les zones agricoles. L'Office de la Protection des végétaux a procédé par endroits à des traitements. Les dégâts sur les cultures sont légers en général mais relativement importants par endroits dans la région de Sikasso. On note également la présence de fortes populations d'oiseaux granivores dans la bande nord de Kayes, dans la région de Mopti, la zone lacustre de Tombouctou et la région de Gao. Des opérations de battues physiques et dénichages sont organisées par les paysans dans la région de Mopti. Les dégâts sur les cultures sont encore légers mais une attention particulière doit être accordée au phénomène aviaire.

Campagne agricole.

Suite à l'installation tardive des pluies, le développement des cultures pluviales accuse un retard léger à important suivant les zones. Les mil/sorgho sont encore aux stades étalés de l'épiaison à la maturation, le maïs de la maturation à récolte, les légumineuses (niébé, woandzou, arachide) de la fructification et formation des gousses à la maturité-récolte. L'aspect végétatif des cultures est bon dans l'ensemble. Cependant, des cas de flétrissement sont constatés çà et là à travers le pays.

Le coton est également aux stades étalés de capsulaison à début éclatement des capsules par endroits.

Malgré ces difficultés, en fin septembre, la physionomie de la campagne agricole pluviale reste moyenne à bonne. Toutefois, l'issue finale de la campagne dépendra de la poursuite des pluies en octobre.

En riziculture, le développement des cultures est normal dans l'ensemble. Les plants sont aux stades étalés de tallage à début épiaison avec un bon aspect végétatif. Des noyades de champs sont enregistrées dans la région de Mopti. L'évolution de la campagne rizicole est jugée moyenne dans l'ensemble.

Les cultures de décrue mil- sorgho sont à la maturation, le riz à la maturation- récolte et le maïs à l'épiaison- maturation. Les perspectives de récolte sont bonnes.

Pour les cultures de décrue à cycle court, les semis sont en cours dans les cercles de Kayes, Yélimané (Kayes) et dans la vallée du Tilemsi à Gao. Les prévisions en emblavures sont nettement plus importantes que celles de la campagne dernière au regard de l'importance des terres inondées

L'évolution d'ensemble de la campagne agricole 2007-2008 est de moyenne à bonne pour les céréales et moyenne à mauvaise pour le coton.

Élevage et Pêche

Les conditions générales d'élevage sont bonnes dans le pays. Les pâturages sont densément fournis et les plans d'eau suffisamment remplis sauf dans la région de Kidal où les puits sont déjà sollicités. Les animaux présentent un bon état

d'embonpoint et la production laitière est jugée bonne en cette période. Les troupeaux poursuivent leur séjour sur les parcours d'hivernage.

La situation épizootique a été marquée par des suspicions de dermatose nodulaire dans le cercle de Sikasso, de peste de petits ruminants dans le cercle de Baraouéli et de fièvre aphteuse à Ménaka. Des mesures de polices sanitaires ont été prises.

La pêche est toujours dans sa phase morte avec la montée des eaux. Les captures de poissons sont faibles mais les perspectives restent favorables.

Migrations

On note l'amorce des départs de bras valides vers les centres urbains et les pays voisins.

Marchés

L'offre en céréales sèches est stable dans l'ensemble et celle de riz en légère augmentation par endroits sur les principaux marchés. Les disponibilités sont partout suffisantes pour la demande solvable. Le prix des céréales sèches est globalement stable avec un niveau inférieur à celui de septembre 2006 sauf dans les régions de Kayes, Koulikoro et Sikasso où il est proche voire supérieur à celui de 2006 dans la majorité des marchés.

Sur le marché à bétail, les effectifs d'animaux présentés à la vente sont stables ou en augmentation. Le prix moyen de la chèvre est globalement en hausse par rapport au mois passé. Les termes de l'échange chèvre- mil sont en amélioration par rapport au mois passé. Comparés à la moyenne des cinq dernières années, ils sont plus favorables aux éleveurs excepté à Bankass où ils restent défavorables.

Habitudes alimentaires

La consommation alimentaire reste normale.

Réserves Alimentaires

Les réserves familiales sont jugées de faibles à moyennes selon les cercles.

Les quantités de céréales déclarées en stocks communautaires sont de 124,075 T de céréales sèches à Kayes ; 105T800 de mil, sorgho et maïs à Sikasso ; 4 847T200 en mil/sorgho et 12T de riz à Ségou ; 1415,133 T de mil/sorgho et de 50,8 T de paddy à Mopti ; 34T500 de mil, 35T700 de riz paddy, 21T de sorgho et 4 T de blé à Tombouctou et 119T165 de vivres (mil, sorgho et riz) à Gao.

Le PAM a distribué en VCT/VCF 116T700 de céréales et huile dans les cercles de Diéma, Nioro et Yélimané.

Les ressortissants du Wassoulou résidents en Espagne ont offert 100T de maïs aux communes du cercle de Yanfolila.

Santé/ Nutrition

La situation épidémiologique est marquée par :

- méningite : 2 cas de méningite dont 0 décès dans les cercles de Banamba, Kolokani (Koulikoro) et 2 cas dont 0 décès dans les cercles de Mopti et Bandiagara.

- 1 cas de paralysie flasque aigue à Banamba dont 0 décès ;

- 3 cas suspects de fièvre jaune à Kati dont 0 décès ;

- et 1 cas de NOMA dont 0 décès à Dioïla.

Selon les enquêtes menées par l'ONG Médecins du Monde dans la commune d'Adielhoc, il existe au niveau du secteur de Inakafel des cas de dracunculose (vers de Guinée) dans 300 ménages dont 0 décès.

Dans le cadre de son programme visant à diminuer la malnutrition chez les enfants de moins de cinq ans et à assister les femmes enceintes et allaitantes, les malades du SIDA et de la tuberculose, le PAM a distribué de la farine enrichie et de l'huile dans les cercles de Bougouni.