

SITUATION PAR INDICATEURS EN SEPTEMBRE 2008

Situation alimentaire

La situation alimentaire reste marquée par un niveau élevé des prix des denrées alimentaires notamment du riz, lait, huile etc. Aussi le pouvoir d'achat reste affecté au niveau, notamment des populations urbaines à faibles revenus. Au cours du mois, le prix du mil s'est maintenu pratiquement stable voire en hausse sur de nombreux marchés à cause de l'augmentation de sa demande aussi bien sur le marché intérieur que sur ceux des pays voisins, liée aux besoins de consommation durant le mois de carême. Cependant la disponibilité physique en céréales reste suffisante sur les principaux marchés.

En milieu rural, la soudure s'adoucit à la faveur des premières récoltes de maïs, niébé, woandzou, fonio (cultivé et de cueillette) en zones agricoles. En zones pastorales, l'on assiste à une période d'abondance en raison de la disponibilité du lait pour l'alimentation humaine.

Pluviométrie et Crue/Décrue des fleuves

La hauteur mensuelle de pluies recueillies est de normale à largement excédentaire et supérieure à celle de septembre 2007 dans la majorité des stations des régions de Kayes et Koulikoro ; ailleurs elle est globalement déficitaire à très déficitaire. Les déficits les plus importants ont été observés dans la région de Mopti et dans le Gourma de Niafunké où des poches de sécheresse ont été enregistrées.

Le cumul des pluies du 1^{er} mai au 30 septembre 2008 est de normal à largement excédentaire sauf dans les stations de Koulikoro, Sikasso, Koutiala, Barouéli, Ansongo et Bourem où il est déficitaire à très déficitaire. Ce cumul saisonnier est globalement supérieur à celui de la campagne précédente excepté dans les régions de Sikasso, Mopti, Tombouctou et Gao où il est inférieur.

La crue se poursuit sur les principaux cours d'eau à l'exception du haut bassin du Sénégal. Cependant, le rythme de montée est jugé faible sur le Bani faisant craindre des problèmes d'irrigation de certaines parcelles. Les côtes relevées au 30 septembre sont supérieures à celles de 2007 à la même date sur tous les cours d'eau sauf sur le Niger/Bani à Mopti et du Bafing en amont de Manantaly.

Déprédateurs

La situation phytosanitaire est caractérisée par :

- des attaques de sautériaux, de cantharides, de chenilles, de pucerons, de termites, d'oiseaux granivores sur les cultures çà et là à travers les

zones agricoles. Les dégâts causés sur les cultures sont légers dans l'ensemble mais moyens à importants par endroits dans la bande Sahélienne de Kayes (Diéma, Nioro), Koulikoro (Nara) et sur le Plateau Dogon à Mopti. Des traitements chimiques et mécaniques ont eu lieu par les brigades villageoises avec l'appui des services techniques et de certains partenaires au développement.

- la menace d'oiseaux granivores qui se fait sentir dans certaines zones rizicoles nécessitant une attention particulière.

- et une situation calme pour le criquet pèlerin.

Campagne agricole.

Au titre des cultures pluviales et de décrue, les mil-sorgho-riz de bas fonds... sont en général au stade de floraison-maturation-récolte, le maïs, le fonio et le Voandzou à la maturité-récolte, l'arachide et le niébé de la fructification à la maturité-récolte, le cotonnier à la capsulaison-éclatement de capsules. Les superficies cultivées sont dans l'ensemble supérieures à celles de l'année dernière excepté le maïs dans la zone CMDT où elles sont en diminution. L'aspect végétatif des cultures est globalement bon mais les poches de sécheresse constatées çà et là notamment dans la région de Mopti, l'insuffisance des engrais et herbicides pour le maïs à Sikasso et Koulikoro, les dégâts des déprédateurs dans le sahel occidental et le Plateau Dogon, pourraient engendrer des baisses de rendement. L'évolution actuelle des cultures est jugée de bonne à moyenne à travers le pays excepté pour le coton où elle est en dessous de la moyenne en raison des réductions de superficies.

En riziculture, la campagne de saison évolue normalement. Le repiquage du riz irrigué se poursuit à présent dans la plaine rizicole de San-Ouest. Les superficies réalisées en riz irrigué, riz de submersion libre et contrôlée sont partout supérieures à celles de l'année dernière ; celles en riz NERICA sont restées faibles en raison de l'insuffisance de semences. Les plants sont aux stades étalés de montaison à début maturation et présentent un bon aspect végétatif. Le déroulement des activités est jugé bon surtout avec la bonne accessibilité à l'engrais (Initiative Riz). Cependant, avec la faiblesse de la crue du Bani, des pertes de superficies faute d'inondation sont déjà enregistrées dans le cercle de San tandis que des cas de noyades sont observés sur

le long du Niger. L'évolution de la campagne rizicole est bonne dans l'ensemble.

L'évolution d'ensemble de la campagne agricole 2008-2009 est bonne dans le pays.

Elevage et Pêche

L'état des pâturages est bon dans l'ensemble mais leur état reste en dessous de la moyenne dans certains parcours au nord du pays. Les conditions d'abreuvement sont partout bonnes. Les troupeaux transhumants sont toujours en séjour dans les pâturages d'hivernage. L'état d'embonpoint des animaux est bon dans l'ensemble. La situation zoo sanitaire est marquée par des cas de dermatose nodulaire contagieuse bovine dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, des cas de suspicion de fièvre aphteuse dans les régions de Koulikoro, Ségou, de peste de petits ruminants et de PPCB dans la région de Sikasso. Des mesures de police sanitaire ont été prises.

La campagne de vaccination contre la pasteurellose bovine, ovine, caprine et le charbon symptomatique se poursuit à travers le pays.

Sur le plan halieutique, la pêche dite de « crue » se poursuit avec des captures faibles. Cependant, avec le niveau d'inondation des frayères, les perspectives de pêche sont bonnes cette année.

Migrations

Des arrivées inhabituelles et des mouvements internes de bras et de ménages se poursuivent dans les cercles de Kadiolo et Kolondiéba autour des sites d'orpillage au détriment des travaux agricoles. Par ailleurs, les départs habituels des bras valides vers les centres urbains se poursuivent à travers le pays

Marchés

Sur les marchés, l'offre en céréales est stable ou en diminution par rapport au mois dernier. Les disponibilités physiques en céréales sont de moyennes à faibles suivant les marchés mais partout suffisantes pour la demande qui est également en diminution grâce à la disponibilité des premières moissons (fonio, maïs, niébé) en zones sédentaires et du lait en zones pastorales. Le prix des mil/sorgho/maïs est en stabilité par rapport au mois précédent sur les marchés de chefs-lieux de cercle des régions de Kayes, Tombouctou, Gao, Kidal et en hausse sur ceux des régions de Koulikoro et Sikasso. Il est en fluctuation suivant les marchés ailleurs avec une prédominance à la baisse dans la région de Mopti tandis que l'on note une hausse sur la majorité des marchés dans celle de Ségou. Le prix des

céréales sèches est partout nettement plus élevé qu'en septembre 2007. Le niveau de prix des mil/sorgho est également supérieur à la moyenne des cinq dernières années sur les marchés.

Les effectifs d'animaux présentés à la vente sont globalement en augmentation par rapport au mois précédent. Le prix moyen de la chèvre est en augmentation par rapport au mois dernier sauf dans la région de Ségou et Gao où il est à la baisse et partout supérieur à la moyenne des 5 dernières années.

Les termes de l'échange chèvre-mil sont également en fluctuation avec cependant une prédominance de détérioration sur les marchés des chefs-lieux des cercles sauf à Kayes et Mopti où l'on note plus d'améliorations par rapport au mois dernier. Comparés à la moyenne des cinq dernières années, ils sont en amélioration sur la majorité des marchés de chefs-lieux de cercle des régions de Mopti, Koulikoro et en détérioration dans l'ensemble ailleurs.

Habitudes alimentaires

Les habitudes alimentaires sont normales.

Réserves Alimentaires

Le niveau des réserves alimentaires familiales est apprécié faible en cette période. Cependant on assiste actuellement à un adoucissement de la soudure chez les agriculteurs avec les 1^{ères} moissons (maïs, fonio...) et à une période d'abondance chez les pasteurs avec la disponibilité du lait pour la consommation humaine.

Au niveau des banques de céréales, les réserves ont été vendues et les stocks sont pratiquement épuisés. Seulement 82,55 T de mil/sorgho et 1 T de paddy dans la région de Mopti; 23,900 T de mil/sorgho et 0,500 T de paddy dans la région de Mopti et 251 T de céréales dans celle de Gao sont déclarées disponibles en banques.

Le PAM a livré au cours du mois 102,395 T de vivres composés de farine de maïs, de farine enrichie, d'huile, de petit pois et de sucre en appui à la santé-nutrition dans la région de Kayes.

Le PDG de AIRNESS a fait un don de 7,500 T de riz et de 3 T de sucre à la commune de Niéna (Sikasso)

La Fondation pour l'Enfance a procédé à une distribution de 2 T de riz; 2 T de mil/sorgho et 0,5 T de sucre à la commune Wassoulou-Ballé (Yanfolila).

Santé/ Nutrition

La situation épidémiologique est marquée par :

- 24 cas de choléra dont 3 décès dans la région de Kayes,
- 1 cas de méningite dont 0 décès dans la région de Koulikoro,
- 2 cas de paralysie flasque aigue dont 0 décès dans les régions de Kayes et Sikasso,
- et 4 cas de fièvre jaune dont 0 décès dans les régions de Koulikoro et Sikasso,

De nombreux cas de paludisme dont 0 décès et 20 nouveaux cas de dracunculose dont 0 décès sont signalés dans la région de Kidal.

Sur le plan nutritionnel, plusieurs cas d'enfants malnutris sont signalés dans la région de Kayes, signe d'une meilleure prise en compte des informations nutritionnelles par les services de santé.