

SITUATION REGION DE SEGOU EN SEPTEMBRE 2008

La situation alimentaire est globalement satisfaisante dans la région.

La hauteur de pluies enregistrées au cours du mois est partout déficitaire à très déficitaire excepté à la station de Niono où elle est excédentaire. Elle est de proche à supérieure à celle de septembre 2007 sauf à Macina et San où elle est inférieure. Des poches de sécheresse ont été observées dans certaines communes de San. S'agissant du cumul des pluies du 1^{er} mai au 30 septembre 2008, il est de normal à excédentaire sauf à Barouéli et San où il est déficitaire. Il est inférieur à celui de l'année dernière dans toutes les stations des chefs-lieux de cercle excepté celles de Ségou et Macina où il est supérieur.

La crue se poursuit sur le Niger et le Bani. Les côtes relevées à la date du 30 septembre sont supérieures à celles de septembre 2007 sur le Niger à Ségou et largement inférieures sur le Bani à San.

La situation phytosanitaire est caractérisée par :

- de légers dégâts de chenilles et/ou sautériaux sur le riz en zone O.N et sur le mil à Monimpébougou ;
- de légers dégâts de cantharides sur le mil dans les cercles de Tominian, San et Macina.
- et la menace des oiseaux granivores dans certaines zones de l'ON ainsi qu'à Saye (Macina) où de légers dégâts ont été signalés sur le mil.

La physionomie de la campagne agricole 2008-2009 est bonne dans l'ensemble.

En cultures sèches, les superficies réalisées sont partout supérieures à celles de l'année dernière, excepté à Macina où elles sont semblables. Les stades végétatifs dominants sont la floraison-maturation pour le mil, le sorgho, récolte pour le fonio, le maïs et la maturation-début récolte pour les légumineuses. L'aspect végétatif des cultures est bon dans l'ensemble mais des cas de flétrissements ont été observés çà et là à travers la région.

En zone Office du Niger, la campagne d'hivernage évolue normalement et la mise en place des cultures est terminée. Les superficies totales réalisées, 79089,85 ha sur une prévision de 80986 ha sont en augmentation par rapport à celles de l'année dernière, 70730 ha. Les plants sont aux stades étalés de montaison à début maturation et présentent un bon aspect végétatif. L'évolution des cultures est jugée bonne surtout avec l'accès facile à l'engrais (Initiative Riz).

En zone ORS, les réalisations sont nettement supérieures à celles de 2007 et aux prévisions (soit 106.92% des prévisions). Les plants sont au stade

de tallage-montaison et la physionomie de la campagne est jugée bonne.

Dans la plaine de San Ouest, le repiquage du riz irrigué se poursuit, de même que les semis pour le riz de submersion contrôlé. Le déroulement de la campagne est jugé normal.

En riziculture de bas-fonds et en submersion libre, les réalisations sont également plus importantes que celles de 2007 sauf en riz NERICA où elles sont très faibles suite à l'insuffisance des semences. Les premiers plants sont au stade d'épiaison-floraison.

Pour la zone CMDT de San regroupant les cercles de Bla, Tominian et San, les superficies réalisées en coton sont de 56% des objectifs et 43% pour le cercle de Barouili (zone CMDT de Fana). Ces réalisations sont cependant supérieures à celles de 2007. Le cotonnier est au stade de capsulaison- éclatement de capsules. La physionomie de la campagne est jugée passable.

Les conditions générales d'élevage sont bonnes. La biomasse herbacée et foliaire est suffisamment dense et les points d'eau sont gorgés. L'état d'embonpoint des animaux est bon. Les troupeaux transhumants poursuivent leurs séjours sur les parcours d'hivernage. La situation zoo sanitaire est marquée par des cas de suspicion de fièvre aphteuse dans certaines communes de San. Des traitements aux antibiotiques ont été effectués dans les zones concernées. La campagne de vaccination contre la pasteurellose bovine, ovine, caprine et le charbon symptomatique se poursuit à travers la région.

Sur le plan halieutique, les prises sont sérieusement affectées par la montée de niveau des eaux. Elles sont dans l'ensemble faibles et en diminution par rapport à celles du mois précédent.

L'approvisionnement des marchés en céréales reste marqué par le faible niveau de l'offre. Cependant, les quantités proposées à la vente couvrent les besoins de consommation des populations qui font de plus en plus recours aux récoltes de soudure (maïs, fonio). Les niveaux des prix restent élevés. La tendance à la hausse des prix se maintient sur la plupart des marchés même si, une légère baisse est observée sur les marchés des chefs-lieux de cercle de Macina et Tominian. Le prix du mil, comparé à celui de septembre 2007 et à la moyenne mensuelle des cinq dernières années, est nettement plus élevé.

Synthèse.

Les effectifs d'animaux présentés à la vente sont stables ou en diminution. Les prix moyens sont en baisse dans l'ensemble par rapport au mois passé. Par rapport à la moyenne mensuelle 2003-2007, le prix de la chèvre est en hausse à Ségou, Niono et en baisse à Macina.

Les termes de l'échange chèvre/mil sont en détérioration sauf à Niono et Ségou où ils sont en amélioration ailleurs par rapport au mois passé. Comparés à la moyenne mensuelle des cinq dernières années, ils sont partout défavorables aux éleveurs sauf à Niono.

Les réserves alimentaires familiales sont faibles à travers la région.

Les stocks communautaires sont pratiquement épuisés.

La situation épidémiologique est jugée calme dans la région.