

## SITUATION REGION DE SIKASSO EN SEPTEMBRE 2008

La situation alimentaire est normale dans la région.

La hauteur mensuelle des pluies tombées est de déficitaire à très déficitaire au niveau des stations de chefs-lieux de cercle sauf à Kolondiéba, Yanfolila et Yorosso où elle est de normale à largement excédentaire. Elle est inférieure à largement inférieure à celle de septembre 2007 excepté au niveau de Kolondiéba, Yanfolila et Yorosso où elle est de voisine à largement supérieure. Le cumul du 1<sup>er</sup> mai au 30 septembre 2008 est de normal à largement excédentaire sauf à la station de Sikasso et Koutiala où il est légèrement déficitaire. La répartition des pluies dans le temps et dans l'espace est globalement bonne à travers les cercles ; toutefois des poches de déficit sont signalées dans la commune de Bourra, cercle de Yorosso.

La crue se poursuit sur les principaux cours d'eau. Les côtes relevées sont inférieures à celles de septembre 2007 sur le Bagoué à Pankourou, le Bafing à Kouoro et le Baoulé à Bougouni.

La situation phytosanitaire est marquée par des attaques:

- de termites sur 111 ha de riz pluvial dans les cercles de Sikasso, Kadiolo et Yanfolila. Les attaques se poursuivent dans le cercle de Sikasso,
  - de cantharides sur 15 ha de riz dans le cercle de Bougouni,
  - de chenilles défoliatrices sur 25 ha de mil à Sikasso,
  - de pucerons sur 157 ha de niébé dans les cercles de Sikasso, Koutiala et Yanfolila. Des traitements chimiques efficaces sont en cours.
- Les dégâts causés sur les cultures sont légers excepté ceux des pucerons sur le niébé qui sont jugés d'ampleur moyenne.

Le déroulement de la campagne agricole 2008/2009 est normal avec les emblavures supérieures à celles de la campagne précédente pour les cultures vivrières sauf dans le cercle de Kadiolo où elles sont inférieures. Les superficies en NERICA sont de 6.424 ha sur une prévision de 25.500 ha soit une réalisation 25,19%. Les cultures de mil/sorgho sont aux stades de l'épiaison-floraison, les maïs et fonio à la maturation-maturité et les riz de l'épiaison à maturation avec cependant poursuite du repiquage pour le riz à maîtrise totale d'eau à l'ODRS. L'insuffisance en engrais et d'herbicides

en général, et de façon localisée des déficits hydriques, des pertes de bœufs de labour et la pénurie en mains d'œuvres liée aux départs des bras valides pour les sites d'orpaillage sont des facteurs qui seront à l'origine des baisses de production notamment pour le maïs à travers la région.

En coton, les superficies mises en cultures sont nettement inférieures à celles de la campagne précédente mis à part dans les cercles de Koutiala et Yorosso où elles sont supérieures. Le retard dans la mise en place des intrants, le non paiement des revenus des récoltes de l'année dernière et la caution solidaire sont les raisons de cette réduction des emblavures. Le développement des cultures en place est normal avec le cotonnier au stade de la capsulaison à l'éclatement des capsules.

L'état des pâturages et les conditions d'abreuvement sont bons à travers l'ensemble de la région. L'état d'embonpoint du cheptel est également bon. La situation zoo sanitaire est marquée par la persistance des cas de fièvre aphteuse dans les cercles de Sikasso, Kadiolo, Yanfolila et Kolondiéba et des cas de peste de petits ruminants à Koutiala; de péripneumonie contagieuse dans le cercle de Kolondiéba et de dermatose nodulaire dans celui de Bougouni.

Dans le cadre de la pêche les prises de poissons sont toujours faibles en cette période de hautes eaux. Les offres en poissons (frais, fumés et séchés) sont en diminution par rapport au mois passé sur les marchés. En poissons congelés, 18.410 kg ont été importées en provenance de la RCI, Guinée et Ouagadougou via Bamako au cours du mois sur les marchés de Sikasso, Bougouni, Kolondiéba contre 25.378 kg le mois dernier.

Des arrivées inhabituelles et des mouvements internes de bras valides et ménages se poursuivent dans les cercles de Kadiolo, Kolondiéba autour des sites d'orpaillage. Ces mouvements de populations se font au détriment des activités agricoles.

Sur les marchés, l'offre en céréales sèches et en riz est en diminution par rapport au mois dernier. Cependant, les disponibilités physiques restent suffisantes pour la demande. Le prix est en augmentation par rapport au mois dernier

## **Synthèse.**

---

pour l'ensemble des céréales. Le prix pour les céréales de prédilection, le sorgho à Koutiala, Yorosso et le maïs pour les autres cercles est nettement plus élevé qu'en septembre 2007.

Les effectifs d'animaux présentés à la vente et ceux vendus sont globalement en augmentation par rapport au mois passé. Les prix moyens sont en hausse excepté à Sikasso, Bougouni et Kadiolo où ils sont en baisse.

Les termes de l'échange chèvre/céréales sont en détérioration par rapport au mois dernier sauf à Yorosso où ils sont pratiquement stables.

Les stocks alimentaires familiaux sont globalement faibles dans la région. Les ventes sont terminées dans les différentes banques de céréales dans tous les cercles de la région.

La situation épidémiologique a été marquée par 2 cas suspects de fièvre jaune à Sikasso et 1 cas de paralysie flasque aigue à Yorosso.