

## SITUATION REGION DE TOMBOUCTOU EN SEPTEMBRE 2008

La situation alimentaire reste relativement satisfaisante dans la région.

La hauteur mensuelle des pluies est de déficitaire à très déficitaire au niveau des stations des chefs-lieux des cercles sauf à Gourma-Rharous et Goundam où elle est largement excédentaire ; elle est cependant nettement supérieure à celle de septembre 2007 excepté au niveau de Tombouctou et Diré où elle est inférieure. Le cumul du 1<sup>er</sup> mai au 30 septembre 2008 est de normal à largement excédentaire sauf à Niafunké où il est légèrement déficitaire ; il est de proche à largement supérieur à celui de l'an passé pour la même période sauf à Tombouctou et Gourma-Rharous où il est inférieur. Les pluies au cours du mois ont été mal réparties dans l'espace, les cercles de Tombouctou et Niafunké étant les moins arrosés.

La montée des eaux se poursuit dans le fleuve Niger. Les côtes relevées au niveau des différentes échelles sont nettement supérieures à celles de septembre 2007. La crue est appréciée favorable au développement des cultures et à un bon niveau de remplissage des lacs et mares à travers la région.

La situation phytosanitaire se caractérise par la présence avec de légers dégâts :

- d'oiseaux granivores autour des champs de mil/sorgho et du riz de décrue dans les cercles de Tombouctou, Goundam et Niafunké ;
- de pucerons et coccinelles sur le niébé de décrue à Goundam, Gourma-Rharous et autour des lacs ;
- et d'acridiens (sautériaux, criquets arboricoles) sur les mil/sorgho de décrue à Niafunké.

Dans le cadre de la campagne agricole, l'aspect végétatif des cultures est de bon à moyen suivant les cultures. Les opérations de désherbage sont en cours pour les cultures de riz des PIV et à terme pour les cultures pluviales et de décrue. Le développement des cultures est normal excepté le mil dunaire et le riz de submersion qui ont accusé un léger retard. A présent, le mil dunaire est aux stades d'épiaison à maturation, les mil/sorgho de décrue à la maturation, le riz des PIV à la montaison, le riz de submersion à la montaison-épiaison et le riz bas-fond à l'épiaison. L'évolution des cultures au titre de la campagne agricole 2008/2009 est bonne pour les décrues, la riziculture et moyenne pour le mil pluvial.

L'état des pâturages et les conditions d'abreuvement sont partout bons dans la région.

L'état d'embonpoint du cheptel est également bon. La situation zoo sanitaire est calme. Les troupeaux sont en séjour, habituel pour la période, dans la frange fluviale de la région, autour des lacs et dans le Gourma intérieur.

Dans le cadre de la pêche, les prises de poissons restent faibles en cette période de forte crue.

Sur les marchés, l'offre en céréales reste pratiquement stable par rapport au mois dernier. Les disponibilités physiques sont faibles mais suffisantes pour une demande également en diminution à la faveur des 1<sup>ères</sup> récoltes (contre-saison, décrue, cueillette..) et de la disponibilité de lait pour la consommation humaine. Le prix des mil/sorgho est en stabilité par rapport au mois dernier au niveau des marchés des chefs-lieux des cercles excepté à Goundam où il est en hausse. Il est partout nettement plus élevé qu'en septembre 2007 et plus élevé que la moyenne mensuelle 2003-2007 sauf à Diré et Goundam où il est voisin.

Les effectifs d'animaux présentés à la vente sont en légère augmentation par rapport au mois précédent et le prix moyen des animaux est pratiquement stable. Le prix moyen de la chèvre est globalement supérieur à la moyenne pluriannuelle 2003-2007 au niveau des chefs-lieux de cercle.

Les termes de l'échange chèvre/mil sont globalement en détérioration par rapport au mois précédent sur les marchés des chefs-lieux de cercle. Comparés à la moyenne des cinq dernières années, ils sont en amélioration excepté à Tombouctou où ils sont en détérioration.

Les réserves alimentaires familiales sont faibles dans l'ensemble dans la région.

Les stocks déclarés au niveau des banques de céréales sont de 21,600 T de mil ; 2,300 T de sorgho et 0,500 T de riz pour la région.

La situation épidémiologique est calme dans la région.